Chirurgia (Bucur) 2010;105(3):347-353

Pancreasul accesor heterotopic în patologia chirurgicală: experiența a 23 de ani

T. Țăranu[1], D. Vintilă[1], N. Neacșu[1], P. Popa[1], C. Luncă[2], F. Crumpei[3], D. Rădulescu[4], șt.O. Georgescu[1]
[1]Clinica II Chirurgie, Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi , U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi
[2]ATI, Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi, U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi
[3]Serviciul de Radiologie al Clinicii I Chirurgie, Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi
[4]Disciplina de Morfopatologie, U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi

Rezumat

Introducere: Prezența aberantă a țesutului pancreatic la nivelul unor segmente digestive este o situație rară dar care constituie sursa unei patologii ce impune deseori rezolvarea chirurgicală.
Material şi metodă: Studiul retrospectiv trece în revistă heterotopia pancreasului accesor (HP) în cazuistica Clinicii a II-a a Spitalului "Sf. Spiridon" Iaşi din perioada ianuarie 1986 – decembrie 2008.
Rezultate: Cele 22 cazuri (15 bărbați/68,2% şi 7 femei/31,8%) cu vârste cuprinse între 23 şi 76 ani, au fost grupate în: A - "clinic simptomatice" (3 pacienți/13,6%), B "coincidentale" (17 pacienți/77,3%) şi C "incidentale" (2 pacienți/9%). Pacienții grupului A au prezentat câte o tumoră polipoidă prepilorică obstructivă pentru care s-a practicat antrectomie cu gastroduodenoanastomoză. 13 pacienți ai grupului B (76,4%) au suferit intervenții pentru stenoză piloroduodenală iar 4 (23,5%) cu HDS gravă au necesitat rezecție gastrică 2/3 (3 cazuri) sau antrectomie (1 caz). La pacientele grupului C heterotopia pancreatică jejunală a fost diagnosticată histopatologic în contextul rezecției multiviscerale pentru tumori maligne de colon ascendent şi respectiv transvers cu invazie jejunală. Heterotopia pancreatică a fost din punct de vedere histologic în 40,9% cazuri de tip I (ducte, acini şi insule pancreatice), de tip II în 45,4% cazuri (acini şi ducte) şi de tip III (exclusiv ducte) în 13,6% cazuri. În 76% din cazuri heterotopia pancreatică s-a situat în mucoasă şi submucoasă, în 16% - în musculară şi în 8% cazuri în subseroasă.
Concluzie: Heterotopia pancreatică este frecvent un diagnostic "surpriză" ocazionat de patologia chirurgicală gastrointestinală.

Cuvinte cheie: heterotopia pancreasului accesor, țesut heterotopic pancreatic

Corespondență: Dr. Traian Țăranu
U.M.F. "Gr. T. Popa" Iaşi
Spitalul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon"
Clinica II Chirurgie
B-dul Indepenenței 1, Iaşi, Romania, 700111
Tel: 0232 240822 int. 175
E-mail: traiantaranu@yahoo.com