Chirurgia. 2011;106(2):259-263

Considerente privind tratamentul endoscopic al refluxului vezicoureteral la copil

S. Ionescu, S. Țîrlea
U.M.F. "Carol Davila", Clinica de Chirurgie Pediatricã, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" Bucureşti

Rezumat
Introducere: Deşi refluxul vezico-ureteral (RVU) este o afecțiune relativ comunã, in prezent existã diferențe de opinii de abordare între urologul pediatru, nefrolog şi pediatru. Societatea Europeana de Urologie Pediatrica, cea de Medicina Perinatala, in colaborare cu nefrologi pediatrii au realizat - pe baza unor studii multicentrice – un consens de abordare a acestei afectiuni. 0 alternativã eficientã este reprezentatã de tratamentul endoscopic.
Material şi metodã: În perioada ianuarie 2002 – decembrie 2008 un numãr de 58 de copii, confirmați în urma cistografiei micționale cu RVU de grad II-V, au suferit injectare sub-ureteralã endoscopicã de dextranomer/acid hialuronic (Deflux®). Refluxul a fost unilateral în 21 de cazuri şi bilateral în restul de 37. Dintre cele 95 de uretere, RVU a fost de gr. II-V în 15(15,79%), 45(47,37%), 28(29,47%) şi respectiv în 7(7,37%) cazuri. Urmarirea şi evaluarea pacienților s-a fãcut pe baza cistografiei micționale şi ecografic.
Rezultate şi concluzii: Refluxul s-a vindecat dupã prima, a doua sau a treia injectare în 63(66,31%), 13(13,68%) şi respective 1(1,05%) uretere. Rezultatele obținute confirmã faptul cã injectarea endoscopicã subureteralã a unui material adecvat oferã avantaje semnificative. Rata înaltã de succes, absența complicțiilor postoperatorii, durata redusã de spitalizare, susțin acest tip de tratament care are indicație în toate gradele de RVU.
Cuvinte cheie: reflux vezicoureteral, tratament endoscopic

Corespondență: Sebastian Ionescu
Clinica de Chirurgie Pediatricã, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie"
B-dul. Constantin Brâncoveanu nr. 20, 041451
Bucureşti, România