Chirurgia (Bucur). 2012;107(1):15-21

Albendazolul asociat chirurgiei sau procedurilor minim invazive în boala hidaticã - dozaj şi duratã

C.M. Crețu[1], R.R. Codreanu[1], B. Mastalier[2], L.G. Popa[1], I. Cordoș[3], M. Beuran[4], D.A. Steriu Ianulle[5], S. Simion[2]
[1]Parasitology Department, Colentina Clinical Hospital, Carol Davila UMF, Bucharest, Romania
[2]Surgical Clinic, Colentina Clinical Hospital, Carol Davila UMF, Bucharest, Romania
[3]Thoracic Surgery Clinic, Marius Nasta Pneumologic Institut, Carol Davila UMF, Bucharest, Romania
[4]Surgical Clinic, Floreasca Emergency Clinical Hospital, Carol Davila UMF, Bucharest, Romania
[5]INCDMI, Carol Davila UMF, Bucharest, Romania

Chistul hidatic este o boalã parazitarã datã de localizarea formei larvare a parazitului în ficat (80%), plãmân, rinichi, splinã, cord etc. Omul este gazdã intermediarã accidentalã. Diagnosticul se stabileşte pe baza investigațiilor de laborator şi imagistice. Tratamentul este multimodal, chirurgical şi medical. Prezintã risc de complicații periculoase şi recidivã. Se impun mãsuri adecvate de urmãrire. Albendazolul joacã un rol central în tratamentul medical al bolii.

Cuvinte cheie: chist hidatic, tratament chirurgical, albendazol

Corresponding author: Bogdan Mastalier MD
Surgical Clinic, Colentina Clinical Hospital
Carol Davila UMF, Bucharest, Romania
E-mail: bogdanmastalier@yahoo.com