Chirurgia (Bucur). 2012;107(3):404-407

Icter obstructiv prin genodermatozã - caz clinic

D. Radu, S. Olariu, M. Teodorescu
Clinica 1 Chirurgie, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă, Universitatea de Medicinã şi Farmacie ”Victor Babeş” Timişoara, România

Rezumat

Introducere: Maladia von Recklinnghausen (M.v.R) este cea mai frecventã dintre neurofibromatoze cu o incidenţă de 1/ 3000-1/5000 de naşteri. Este o genodermatozã cu transmitere autozomal dominantã. Gena patologicã incriminatã în apariţia bolii este situatã pe cromozomul 17, produsul genei, neurofibrominã, proteinã cu rol în controlul diferenţierii şi proliferãrii celulare. Manifestãrile cutanate se pot asocia cu afectãri ale organelor interne. Tratamentul este chirurgical pentru neurofibroamele mari. Transformarea malignã oferã un prognostic rezervat, alãturi de scãderea calitãţii vieţii în prezenţa complicaţiilor, cum este în cazul prezentat: icter mecanic obstructiv.

Material şi metoda: Pacienta în vârstã de 75 de ani, internatã pentru icter obstructiv (progresiv, pruriginos), formaţiuni papilomatoase cutanate (0,5-3 cm) pe trunchi şi câteva pete hiperpigmentate, cafenii (5-6 cm diametru). Leziunile cutanate (de 45 de ani) au fost diagnosticate histopatologic anterior.

Rezultate: Se intervine chirurgical, anestezie generalã. IOT se practicã: colecistectomie, controlul CBP (instrumental, colangiografic şi endoscopic). În porţiunea terminalã a CBP se constatã formaţiuni tumorale papilomatoase care obstruează complet calea biliarã. Se extirpã parţial leziunile papilomatoase şi se practicã coledoco-duodeno-anastomozã L-L, în ţesut sãnãtos. Examenul histopatologic evidenţiazã neurofibrodermatozã tip 1. Evoluţie favorabilã se externează vindecatã la 12 zile post-operator.

Concluzii: 1. Formã rarã de icter obstructiv, în care diagnosticul etiologic se stabileşte postoperator în urma examenului histo-patologic. 2. Diagnosticul clinic preoperator a sugerat posibilitatea unui icter mecanic prin proces proliferativ.

Cuvinte cheie: neurofibromatozã, icter obstructiv, tumori papilomatoase, coledoco-duodenoanastomozã

Corespondenţã: Dr. Daniela Radu
Clinica 1 Chirurgie, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă
U.M.F. ”Victor Babeş” Timişoara, România
B-dul I. Bulbuca nr. 10, cod poştal 300723
Tel/fax:0256464564
E-mail: contact@chirurgie.ro