

Diverticulul jejunal – cauză de sângerare intestinală

R. Vilallonga¹, J.L. Sanchez Garcia², M. Armengol², N. Iordache³

¹Endocrine, metabolic and bariatric Unit, General Surgery Department, University Hospital Vall d'Hebron, Center of Excellence for the EAC-BC, Barcelona, Spain

²Colorectal Unit, General Surgery Department, University hospital Vall d'hebron, Barcelona, Spain

³Department of General Surgery, "Sf. Ioan" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Diverticuliile intestinului subțire sunt formațiuni rar întâlnite. În unele cazuri pot fi asociate cu complicații ca de exemplu sângerare gastrointestinală. Prezentăm cazul unui pacient de 39 de ani cu șoc hemoragic secundar unei sângerări gastrointestinale, recurente. S-au administrat transfuzii de sânge și s-a realizat arteriografie selectivă, evidențiind sângerare activă la nivelul arterei ileocolice. S-a intervenit chirurgical și s-a observat prezența de sânge la nivelul întregului colon și a intestinului subțire până la 40 cm de unghiul Treitz, unde s-au evidențiat de asemenea diverticuli multipli. S-a realizat rezecție intestinală. Deși diverticuliile duodenojejunale nu reprezintă o entitate frecvent întâlnită, ar trebui să avem în vedere această patologie în special în cazurile de hemoragie digestivă superioară recurentă, cum este cazul pacientului nostru.

Cuvinte cheie: hemoragie digestivă, diverticuli jejunali, intestin subțire

Corresponding author: Ramon Vilallonga, M.D.

General Surgery Department Endocrine

Metabolic and Bariatric Unit University Hospital Vall d'Hebron

Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129, 08035 Barcelona (Spain)

Tel: 0034 62642585, Fax: 0034 932746224

E-mail: vilallongapuy@hotmail.com