Chirurgia (Bucur). 2013;108(3):341-345

Utilizarea gastrostomelor la pacienții cu neoplazie cervico-facială

A.G. Anghel[1], I. Anghel[1], M. Dumitru[1], D. Cristian[2], T. Burcoș[2]
[1]E.N.T. Department, Coltea Clinical Hospital, Bucharest, Romania
[2]Surgery Department, Coltea Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Scop: Inventarierea cazurilor de neoplasm cervico-facial ce au beneficiat de gastrostomã în cadrul Spitalului Clinic Colțea București cu evidențierea similaritãților și diferențelor față de datele publicate la nivel mondial.

Pacienți și metode: Am analizat retrospectiv 64 de proceduri de gastrostomã din perioada 2008-2011, efectuate la pacienți cu neoplazie cervico-facialã.

Rezultate și discuții: Grupul nostru de studiu a prezentat numeroase caracteristici specifice (un numãr mai mare de cazuri cu vârsta peste 55 ani decât pacienți tineri; predominanța utilizãrii gastrostomiei chirurgicale în defavoarea tehnicilor minim invazive; aproximativ 2/3 din gastrostome au fost efectuate la pacienți cu carcinom laringian; aproximativ 1/3 din gastrostome au fost instalate pretratament; etc).

Concluzii: 22% din gastrostome au fost efectuate dupã apariția unei fistule faringocutanate. Astfel vom demara un viitor studiu prospectiv pentru a verifica dacã utilizarea profilacticã a PEG va duce la scãderea apariției fistulelor faringocutanate.

Cuvinte cheie: neoplazie cervico-facialã, gastrostomã, PEG, fistule faringocutanate, chimio-radio-terapie

Corresponding author: Ion Anghel MD
E.N.T. Department Colțea Clinical Hospital
I.C. Brãtianu Ave. 1-3, 3rd district, 030171, Bucharest, Romania
Tel. 021.387.41.14
E-mail: ionangheldoc@yahoo.com