Chirurgia (Bucur). 2013;108(5):631-642

Importanța clinicã a clasificãrii pancreatitei acute pe baza factorilor determinanți

D. Cochior[1], S. Constantinoiu[2], C. Copãescu[3], D. Șerbãnoiu[4], R. Bîrlã[2], M. Boeriu[5]
[1]"Titu Maiorescu" University, Department of Surgical Disciplines, Faculty of Medicine, Surgical Department Hospital CF 2, Bucharest, Romania
[2]UMF "Carol Davila", Department for General and Esophageal Surgery "St. Mary" Hospital, Bucharest, Romania
[3]Delta Hospital, Bariatric Center of Excellence, Bucharest, Romania
[4]Surgical Department Hospital CF 2, Bucharest, Romania
[5]Department for General and Esophageal Surgery "St. Mary" Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Scop: Această clasificare ar trebui să elimine confuziile din terminologie apărute în ultimii 20 de ani cu implicații directe în practica clinicã.

Metodã: Studiul a avut la bază consultarea pe web a speciliştilor la nivel mondial. Au fost trimise 528 de invitații şi au fost primite 240 de răspunsuri din 49 de țări reprezentând toate continentele.

Rezultate: În încercarea de a elimina majoritatea confuziilor vechii clasificări au fost emise definiții ce au încorporat conceptele moderne ale bolii, s-a îmbunătățit evaluarea clinicã a severității pe baza factorilor determinanți locali şi sistemici, s-au creat premizele unei raportări de date standardizate.

Critici: O clasificare idealã ar trebui să reflecte întregul tablou al modificărilor clinico-paraclinice ale unui pacient, la un moment dat. În clasificarea adoptatã, variabila principalã ce caracterizează gradul severității este numai disfuncția de organe tranzitorie sau persistentã.

Concluzii: Cea mai importantã contribuție este redefinirea complicațiilor locale bazate pe conținutul acestora, existența sau inexistența peretelui, locul de apariție şi evoluția acestora în timp (factori determinanți locali). Factorii determinanți sistemici iau în considerare prezența disfuncțiilor de organ (tranzitorii sau persistente). Prezența factorilor determinanți are un efect cumulativ, se pot influiența reciproc iar infecția poate apare la toate cele patru tipuri de leziuni.

Cuvinte cheie: clasificare, severitate, pancreatita, colecții fluide acute, necroza pancreaticã sau peripancreaticã, necroza încapsulatã/închistatã

Corresponding author: Daniel Cochior, MD, PhD
Principal Investigator I
„Titu Maiorescu" University, Surgical Disciplines Department
Faculty of Medicine, Surgical Department Hospital CF 2
Mãrãşti Avenue, 63, sector 1, 011464, Bucharest, Romania
E-mail: cochiordaniel@gmail.com