Chirurgia (Bucur). 2013;108(6):764-769

Influența modelului analgetic asupra durerii postoperatorii în chirurgia ortopedică majoră a genunchiului

D.M. Anastase[1], S. Cionac Florescu[1], A-M Munteanu[1], I.C. Stoica[2], D. Antonescu[2]
[1]Anesthesiology and Intensive Care Department, Clinical Orthopedic Hospital Foisor, Bucharest, Romania
[2]Orthopedic Clinic, Clinical Orthopedic Hospital Foisor, Bucharest, Romania

Rezumat

Artroplastia primară de genunchi reprezintă un model de durere severă în chirurgia ortopedică majoră. Un bun control al durerii postoperatorii este important atât pentru pacient cât și pentru obținerea unui rezultat funcțional bun al intervenției, mobilizarea precoce a genunchiului fiind limitată de durere. Studiul de față își propune trecerea în revistă a principalelor modele analgetice folosite în artroplastia primară de genunchi și influența acestora asupra durerii și a recuperării funcționale a genunchiului. Analiza comparativă a modelelor analgetice arată avantajele și efectele secundare ale fiecarei metode, evoluția în timp a acestora și ne ghidează cum să folosim medicina bazată pe dovezi. Alegerea modelului analgetic cel mai potrivit aparține însă echipei formate din ortoped-medicul anestezist și kinetoterapeut, care pot stabili individual, pentru fiecare pacient obiectivele unui bun rezultat funcțional al articulației genunchiului.

Cuvinte cheie: artroplastia de genunchi, durere, rezultat funcțional

Corespondență: Denisa Mădălina Anastase, MD
Anesthesiology and Intensive Care Department, Clinical Orthopedic Hospital Foisor, Bucharest, Romania
E-mail: danastase1@gmail.com