Chirurgia (Bucur). 2013;108(6):886-891

Incidentaloame adrenale și hipofizare într-un caz de sindrom Cushing

C. Poiană[1,2], C. Chiriţă[3], M. Carșote[1], D. Hortopan[2], D. Ioachim[2], C.M. Corneci[2], B. Stănescu[1,2]
[1]Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
[2]C.I. Parhon Institute of Endocrinology, Bucharest, Romania
[3]Anima Speciality Medical Services, Bucharest, Romania

Rezumat

Sindromul Cushing este una dintre patologiile endocrine în care chirurgia poate salva vieți. Diagnosticul corect depinde de paternul hormonal bazal al pacientului, corelat cu diferite teste dinamice și investigații imagistice. Prezentăm cazul unei paciente cu sindrom Cushing, asociat cu tumori adrenale bilaterale și un microadenom pituitar. Pacienta prezenta nivele crescute de cortizol plasmatic, nesupresibile în timpul testelor cu doză mică şi cu doză mare de dexa-metazonă. S-a practicat adrenalectomie laparoscopică dreaptă, după care pacienta a dezvoltat insuficiență suprarenală acută. La 2 ani de la intervenție, încă necesită terapie de substituție suprarenală. Insuficiența suprarenală acută este o complicație severă a chirurgiei adrenale, cu o mortalitate înaltă dacă nu este recunoscută.

Cuvinte cheie: sindrom Cushing, adrenalectomie, incidentaloame

Corespondență: Cătălina Poiană, MD
"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
C.P. 38-21, postal code 023573
E-mail: endoparhon@gmail.com