Chirurgia (Bucur). 2014;109(1):117-122

Rezecția recto-sigmoidiană pe cale laparoscopică la copil

M. Oancea[1,2], L. Vatra[1], A. Kadar[1], C. Copăescu[3]
[1]Department of Pediatric Surgery, "M.S. Curie" Emergency Clinical Hospital for Children, Bucharest, Romania
[2]"Victor Babeș" University of Medicine and Pharmacy, Timișoara - PhD Student
[3]Minimal Invasive Surgery Department, "Ponderas" Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Rezecția rectosigmoidiană pe cale abdomino-perineală, imaginată și realizată pentru prima dată de către Orwar Swenson în 1948, a fost intervenția chirurgicală care a deschis calea chirurgiei curative în megacolonul congenital (1). Cu intenția de a corecta complicațiile asociate operației Swenson, B. Duhamel (1956) și F. Soave (1964) au propus procedee chirurgicale care păstrează rectul aganglionar (2,3). În 1994, N. Bax realizează operația Duhamel pe cale laparoscopică (4). K. Georgeson efectuează în 1995 rezecția rectosigmoidiană pe cale laparoscopică, imaginată ca o reproducere prin abord minim-invaziv a operației Swenson (5). Intervenția realizată de către Georgeson s-a impus ca standard de intervenție curativă și este procedeul chirurgical cel mai des folosit în practica curentă.

Cuvinte cheie: megacolon congenital, laparoscopie

Corresponding author: Marcel Oancea, MD
Department of Pediatric Surgery
Emergency Clinical Hospital for Children "M.S. Curie" Bucharest, Romania
E-mail: mar_oancea@yahoo.com