Chirurgia (Bucur). 2014;109(1):7-14

Diagnosticul diferențial al defectelor de perete abdominal – omfalocel versus gastroschizis

S. Ionescu[1], M. Mocanu[1], B. Andrei[1], B. Bunea[1], C. Carstoveanu[2], A. Gurita[3], R. Tabacaru[3], E. Licsandru[1], D. Stanescu[4], M. Selleh[1]

[1]Department of Pediatric Surgery, "Marie S. Curie" Emergency Children Hospital, Bucharest, Romania

[2]Neonatal Intensive Care Unit, "Marie S. Curie" Emergency Children Hospital, Bucharest, Romania

[3]Department of Anesthesiology and Intensive Care, "Marie S. Curie" Emergency Children Hospital, Bucharest, Romania

[4]Department of Radiology, "Marie S. Curie" Emergency Children Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Nou-născutul cu un defect de perete abdominal reprezintă una dintre cele mai dramatice situații în medicină, dar în acelaşi timp reprezintă o provocare pentru chirurgii pediatrii. Acest articol prezintă noțiunile fundamentale referitoare la cele mai frecvente defecte de perete abdominal – gastroschizisul şi omfalocelul – incluzând opțiunile şi principiile de abordare prenatală şi postnatală. Deşi aceste malformații congenitale de perete abdominal sunt grupate întotdeauna, acestea sunt două entități separate şi distincte, având multe diferențe importante în ceea ce priveşte patologia şi condițiile asociate, acest lucru explicând diferențele în atitudinea terapeutică şi rezultate.

Este esențială întelegerea asemănărilor şi deosebirilor dintre gastroschizis şi omfalocel pentru un management corect al nou născutului. De aceea, articolul pune în evidență în primul rând asemanările dintre cele două defecte parietale, apoi
subliniind diferențele dintre acestea.

Cuvinte cheie: omfalocel, gastroschizis, diagnostic antenatal, management antenatal

Corresponding author: Sebastian Ionescu, MD
Department of Pediatric Surgery
"Marie S. Curie" Emergency Children Hospital
No 20, Constantin Brancoveanu blvd., sector 4, Bucharest – 041451, Romania
E-mail: nsionescu@yahoo.com