Chirurgia (Bucur). 2014;109(2):223-228

Factori de risc care au influențat rezultatele postoperatorii la 138 de pacienți consecutivi cu anevrism de aortă infrarenală: experiența centrului de Chirurgie Cardiovasculară Cluj-Napoca

A. Molnar, D. Săcui, T. Scridon
Cardiovascular Surgery Clinic, Heart Institute, Cluj-Napoca Romania

Rezumat

Anevrismele aortei abdominale reprezintă o patologie comună, cu o incidență în creştere în ultimele decenii. Din păcate, rata mortalității pentru anevrismele abdominale rupte este şi ea crescută. Scopul acestui studiu retrospectiv a fost determinarea factorilor de risc care pot interfera cu rezultatele tratamentului chirurgical, în special cu ratele morbidității şi mortalității.

Materiale şi metode: În studiu au fost incluşi 138 de pacienți consecutivi cu anevrism de aortă abdominală infrarenală, care au beneficiat de chirurgie electivă (pentru anevrisme cronice), sau chirurgie de urgență (pentru anevrisme rupte), în Clinica de Chirurgie Cardiovasculara Cluj-Napoca în perioada Ianuarie 2003 - Decembrie 2011. Am luat în considerare bolile cardiovasculare asociate şi cele mai frecvente complicații postoperatorii apărute la pacienții luați în studiu. S-au practicat trei tipuri de intervenții: interpoziție de graft tubular, bypass aorto-biiliac şi bypass aorto-bifemural.

Rezultate: Mortalitatea perioperatorie în cazul intervențiilor elective a fost de 5.68% (5 / 88), iar pentru intervențiile urgente a fost de 46% (23 / 50).

Concluzii: Anevrismul aortic abdominal rupt continuă să reprezinte o patologie asociată cu riscuri substanțiale şi mortalitate ridicată. De aceea, considerăm oportun screening-ul selectiv şi intervențiile programate pentru îmbunătățirea ratei de supraviețuire a pacienților cu anevrism aortic infrarenal.

Cuvinte cheie: factori de risc, anevrism, aortă infrarenală, ruptură, perioperator, mortalitate

Corresponding author: Adrian Molnar
Heart Institute, Cardiovascular Surgery Clinic
no. 2-4, Clinicilor Street, Cluj-Napoca, Romania
E-mail: adimolnar45@yahoo.com