Chirurgia (Bucur). 2020;115(4):526-529
http://dx.doi.org/10.21614/chirurgia.115.4.526

Icter mecanic secundar migrării unui clip chirurgical în calea biliară principalã la 9 ani dupã colecistectomie laproscopicã

Mihai Angelescu, Octavian Enciu, Victor Florescu, Adrian Miron
Department of Surgery, Elias University Emergency Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Migrarea unui clip chirurgical în calea biliară principală cu formare consecutivă de calcul reprezintă o complicaţie rară după colecistectomie laparoscopică, mai puţin de 100 de cazuri fiind raportate până în prezent. Prezentăm cazul unei femei de 55 de ani cu icter obstructiv prin calcul format în jurul unui clip migrat la 9 ani după colecistectomie laparoscopică. Ecografia abdominală a diagnosticat dilatarea căii biliare principale şi a căilor biliare intrahepatice iar computer tomografia a indicat prezenţa unui clip metalic în partea distală a coledocului. Tratamentul prin colangio-pancreatografie endoscopică
retrogradă (ERCP) a fost eficient iar clipul a fost recuperat folosind sonda Dormia. Mecanismul exact prin care se produce migrarea clipului nu este complet înţeles dar poate fi explicat de inflamaţia locală şi clipare ineficientă. Deşi este un eveniment rar, migrarea de clip nu ar trebui exclusă în diagnosticul
diferenţial al pacienţilor cu icter sau colangită după colecistectomie laparoscopică. Tratamentul minim invaziv prin ERCP este prima opţiune de tratament pentru complicaţii produse de clipuri migrate dar explorarea chirurgicală a căii biliare poate fi necesară.

Cuvinte cheie: migrare de clip, icter obstuctiv, ERCP, colecistectomie laparoscopică