

Tumoră neuroendocrină rectală cu evoluție agresivă

Augustin Marian Marincas, Virgiliu Prunoiu, Eugen Bratucu, Tudor Proca, Sinziana Ionescu
"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
First Clinic of General Surgery and Oncology, "Prof. Al. Trestioreanu" Oncology Institute, Bucharest, Romania

Rezumat

Tumorile neuroendocrine sunt neoplasme epiteliale rare, cu caracteristici biologice tumorale specifice care pot pune probleme de diagnostic și tratament și care au în general un prognostic bun. În ultimele decenii incidența tumorilor neuroendocrine ale rectului a crescut datorită accesibilității colonoscopiei și a introducerii programelor de screening pentru tumorile colorectale. Noi prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 55 ani care s-a internat în data de 05.11.2018 pentru rectoragii debutate cu circa 6 luni înainte. La internare s-a constatat pacient cu stare generală bună, iar examenul clinic și paraclinic au confirmat diagnosticul de tumoră malignă rectală stadiul IV. Examenul histopatologic nu a putut face distincția între un carcinom nediferențiat și o tumoră neuro-endocrină. Diagnosticul de tumoră neuroendocrină cu evoluție agresivă a fost precizat de examenul IHC (Ki67 75-80%, G3). Datorită agresivității mari a tumorii pacientul a avut o evoluție rapidă spre agravare iar instalarea insuficienței hepatice nu a permis aplicarea tratamentului antitumoral sistemic. În concluzie putem spune că în tumorile neuroendocrine rectale stadiul bolii și indicele Ki67 au o importantă valoare prognostică, iar în stabilirea diagnosticului și a agresivității tumorii examenul IHC este obligatoriu. Deși sunt în general tumori mici bine diferențiate, cu un prognostic destul de bun, există și forme cu tumori de dimensiuni mari cu metastaze și cu prognostic grav.

Cuvinte cheie: tumoră neuroendocrină, tumoră rectală