

**Repararea chirurgicală a leziunilor duodenale iatrogene prin duodenojejunostomie pe ansă Roux-en-Y: o abordare orientată spre fiziologie**

Dimitrios Symeonidis<sup>1</sup>, Athina A. Samara<sup>1</sup>, Alexandros Diamantis<sup>1</sup>, Ioanna-Konstantina Sgantzu<sup>2</sup>, Theodoros Floros<sup>1</sup>, Dimitrios Zacharoulis<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Surgery, University Hospital of Larissa, Greece

<sup>2</sup>Department of Radiology, University Hospital of Larissa, Greece

**Rezumat**

*Introducere:* Leziunile duodenale iatrogene reprezintă o afecțiune cu morbiditate și mortalitate ridicate. Managementul este încă unul controversat, fără un consens între experți în ceea ce privește tratamentul optim. Scopul prezentului studiu este testarea și evaluarea rezultatelor unei anumite tehnici de reconstrucție.

*Materiale și metode:* Studiul include 4 pacienți (2 bărbați și 2 femei) cu vârsta medie de 83 de ani cu leziuni duodenale iatrogene, la care s-a practicat repararea chirurgicală a perforației duodenale prin duodenojejunostomie în două straturi cu ansă jejunală Roux-en-Y.

*Rezultate:* Trei din patru pacienți (75%) au avut o recuperare rapidă și necomplicată (durata medie de spitalizare postoperatorie de 13 zile), în timp ce al patrulea pacient a decedat în UTI din cauza SDRA trei săptămâni mai târziu, fără, totuși, dovezi ale unei fistule anastomotice.

*Concluzie:* O varietate de tehnici de reparare chirurgicală au fost propuse până în prezent cu rezultate controversate. Anastomoza duodeno-jejunală pe ansă Roux-en-Y pare să îndeplinească toate condițiile pentru un rezultat anastotic de succes și s-a dovedit eficientă în cazul pacienților incluși în studiu.

**Cuvinte cheie:** leziuni duodenale iatrogene, ansa jejunală Roux-en-Y