

## **Lambouri de transpoziție utilizate în reconstrucția defectelor auriculare rămase în urma chirurgiei MOHS**

Anita Barcan, Irina Nasturica, Valentin Vladioiu, Andreea Mite, Andrei Museteanu, Florin Bobirca, Mihaela Leventer  
Dr Leventer Centre, Bucharest, Romania

### **Rezumat**

Închiderea defectelor localizate la nivelul urechii poate fi o provocare chirurgicală semnificativă, din cauza structurii cartilajinoase tridimensionale complexe a acestei regiuni.

*Pacienți și rezultate:* Vă prezentăm o serie de 5 cazuri retrospective, ale unor defecte auriculare, rămase în urma exciziei cancerelor de piele prin microchirurgie Mohs, care au necesitat închidere utilizând lambouri de transpoziție și particularitățile acestora.

*Discuții și concluzii:* Există diverse proceduri chirurgicale descrise pentru reconstrucția unui defect al urechii, precum, lambouri, grefe de piele și chiar vindecarea per secundam. În opinia noastră, lambourile de transpoziție pot fi o opțiune bună atunci când defecte sunt localizate la nivelul tragusului, concai, fosei triunghiulare, părții superioare a helixului sau chiar părții mediale a urechii. Acest tip de lambou permite reconstrucția într-o singură etapă chirurgicală cu morbiditate scăzută și rezultate cosmetice favorabile.

**Cuvinte cheie:** lamboul de transpoziție, lambou tunelizat, micorchirurgie Mohs, cancer de piele, defecte ureche