

Abcesul de lob mediu pulmonar: o complicație întârziată după colecistectomia laparoscopică

Nicoleta Leopa^{1,2}, Valerian Cristian Pavaloiu^{2,3}, Mihaela Pundiche^{1,2}, Razvan Bosneagu^{1,2},
Razvan Catalin Popescu^{1,2}

¹Department of General Surgery, Emergency Hospital of Constanta, Romania

²Ovidius University, Faculty of Medicine and Pharmacy Constanta, Romania

³Department of Thoracic Surgery, Emergency Hospital of Constanta, Romania

Rezumat

Introducere: Colecistectomia laparoscopică a devenit o procedură de rutină în intervențiile chirurgicale abdominale, o regulă de "aur" în tratamentul litiazei veziculare. Perforația iatrogenă a veziculei biliare cu biliragie și eliberarea intraperitoneală de calculi biliari în timpul unei colecistectomii este un incident posibil, însă nerezolvat poate duce la numeroase complicații. Complicațiile la nivel pulmonar postcolecistectomie laparoscopică sunt extrem de rar întâlnite.

Prezentare de caz: Relatăm cazul unei paciente de 62 de ani cu abces subfrenic și fistulă transdiafragmatică în lobul pulmonar mediu după colecistectomie laparoscopică. În acest caz, simptomele pulmonare au dominat tabloul clinic și explorările complementare inițiale au indicat o patologie strict pulmonară. Evoluția inițială a pacientei a fost spre agravare, iar explorările ulterioare au stabilit diagnosticul real.

Concluzii: Perforațiile veziculei biliare cu pierderea accidentală a calculilor biliari ar trebui să fie recunoscute imediat și manageriate. În dezvoltarea unui abces pulmonar se poate lua în considerare ca și cauză o patologie intraperitoneală.

Cuvinte cheie: calculi biliari restanți, complicații tardive, abces pulmonar